






Diffuus reticulair



Eilandjes reticulair




Perifeer reticulair met
centraal structuurloze
hypopigmentatie




Perifeer reticulair met
centraal structuurloze
hyperpigmentatie



Structuurloos




Perifere klodders/ radiaire lijnen



Centraal klodders met
perifeer reticulair



Klodders




Klodders én reticulair

Gebaseerd op de patroonanalyse van benigne melanocytaire naevi zoals beschreven door Jaimes en Marghoob


Jaimes N, Marghoob AA. Benign nevi patterns. In: Marghoob AA, Usatine RP, Jaimes N. Dermoscopy for the Family Physician. Am Fam Physician. 2013;88(7):441-450.



Reticulair met asymmetrie




Radiaire lijnen met
asymmetrie




Excentrisch structuurloos
met hyperpigmentatie




Perifere en asymmetrische
klodders



Excentrisch structuurloos
met hypopigmentatie



Structuurloos en reticulair
met asymmetrie



Polymorfe bloedvaten



Witte lijnen

Gebaseerd op melanoom patronen van Jaimes & Marghoob

Marghoob AA, Usatine RP, Jaimes N. Dermoscopy for the family physician. Am Fam Physician. 2013 Oct 1;88(7):441-50. PMID: 24134084.